schülke

Desinfektionsplan Physiotherapie

	Was	Womit	Wann	Wie	Zubereitung der Lösung
	Händewaschen	**esemtan® wash lotion**	Vor Arbeitsbeginn, nach Arbeitsende, bei sichtbar verschmutzten Händen	Hände waschen, gut nachspülen und mit Einmalhandtuch abtrocknen	Gebrauchsfertige Waschlotion Wie handelsübliche Präparate anwenden
	Händedesinfektion	**desderman® pure / gel, desmanol® pure**	Vor und nach Untersuchungen und Eingriffen, nach Ausziehen von Einmalhandschuhen	Hygienische Händedesinfektion: 3 ml 30 Sekunden in den Händen einreiben Chirurgische Händedesinfektion: 5 ml 90 Sekunden einreiben	Fertige Gebrauchslösung Keine Wasserzugabe
	Händepflege	**esemtan® hand emulsion**	Vor grossen Pausen, nach Arbeitsende	Nach dem Händewaschen und/oder der Händedesinfektion die Handemulsion gut einreiben	Gebrauchsfertige Handemulsion
	Hautdesinfektion	**kodan® forte farblos, octeniderm®**	Vor operativen Eingriffen, Injektionen und Punktionen	Betreffende Hautstelle mit Desinfektionsmittel benetzen und einwirken lassen **Injektionen: 15 Sekunden** **Punktionen: 60 Sekunden**	Fertige Gebrauchslösung Keine Wasserzugabe
	Schleimhaut-, Wund-, und Hautdesinfektion, Verbrennungen	**octenisept®**	Vor diagnostischen und operativen Massnahmen Zur Wundbehandlung	Mit Tupfer auftragen, die zu desinfizierenden Stellen vollständig benetzen und **1 Minute einwirken lassen**	Gebrauchsfertige, wässrige Lösung
	Mundschleimhautantiseptik	**octenimed®** Gurgellösung	Vor und nach Eingriffen an der Mundschleimhaut	Mit ca. 15ml Mundspül-Lösung ca. 30 Sekunden spülen. Je nach Bedarf 2- bis 3-mal täglich anwenden. Nicht schlucken. Unmittelbares Nachspülen, Essen und Trinken möglich	Fertige Mundspül-Lösung Keine Wasserzugabe
	Instrumenten	**gigasept® Instru AF**	Nach jedem Gebrauch	Instrumente einlegen, nach **30 Minuten** Einwirkzeit mechanisch reinigen, abspülen und ggf. sterilisieren **Die Einsatzkonzentration / Einwirkzeit nach EN / prEN lautet:** **3,0% - 15 Min. 2,0% - 30 Min. 1,5% - 60 Min.** Im Ultraschall: 3,0% / 5 Minuten. (Standzeit der Lösung 1 Tag)	2,0% Desinfektionslösung 20 ml gigasept® Instru AF 980 ml Wasser = 1000 ml Desinfektionslösung Standzeit der Lösung: 7 Tage
	Schnelldesinfektion von medizinischen Geräten, Apparaten, Flächen und Mobiliar	**mikrozid® AF liquid, AF wipes, AF wipes premium, AF jumbo**	Nach jeder Benutzung	Flächen mit mikrozid® AF benetzen, einwirken lassen und ggf. mit Einmalpapiertuch nachwischen **Einwirkzeit: 1 Minute**	Gebrauchsfertige Lösung und gebrauchsfertige Tücher (Acrylglas, lackiertes Holz nicht mit mikrozid® AF behandeln!)
	Alkoholfreie Schnelldesinfektion von medizinischen Geräten, Flächen und Mobiliar	**mikrozid® sensitive liquid, sensitive wipes, sensitive wipes premium**	Nach jeder Benutzung für alkoholempfindliche Flächen	Flächen mit mikrozid® sensitive benetzen und einwirken lassen **Einwirkzeit: 1 Minute**	Alkoholfreie gebrauchsfertige Lösung und gebrauchsfertige Tücher
	Fussböden, Sanitärbereich, Inventar, Geräte und Mobiliar	**terralin® protect**	Täglich oder nach Kontamination und Verschmutzung	Flächen feucht-nass abwischen / Handschuhe tragen **Einwirkzeit: 1 Stunde**	0,5% Desinfektionslösung 5 ml Konzentrat auf 995 ml Wasser = 1000 ml Desinfektionslösung

Schülke & Mayr AG | Sihlfeldstrasse 58 | 8003 Zürich | Schweiz | Tel. +41 44 466 55 44 | Fax +41 44 466 55 33 | mail.ch@schuelke.com | www.schuelke.com 08.14

schülke

Plan de désinfection en milieu physiothérapie

	Quoi	Avec quoi	Quand	Comment	Préparation de la solution
	Lavage des mains	**esemtan® wash lotion**	Avant de commencer à travailler, en fin de tâche, lorsque les mains sont visiblement sales	Se laver les mains, bien les rincer et les sécher à l'aide d'un essuie-main à usage unique	Lotion de lavage prête à l'emploi. A utiliser de la même manière que les solutions usuelles
	Désinfection des mains	**desderman® pure /gel, desmanol® pure**	Avant et après chaque examen et interventions, après le retrait des gants à usage unique	Désinfection hygiénique des mains : appliquer 3 ml de solution dans le creux de la main et frictionner les mains pendant 30 secondes Désinfection chirurgicale des mains : se frictionner les mains avec 5 ml de solution pendant 90 secondes	Solution prête à l'emploi Pas de dilution aqueuse
	Soin des mains	**esemtan® hand emulsion**	Avant une pause prolongée, à la fin d'une tâche	Se frictionner les mains avec l'émulsion après le lavage et/ou la désinfection des mains	Emulsion pour les mains prête à l'emploi
	Désinfection de la peau	**kodan® forte incolore, octeniderm®**	Avant toute intervention chirurgicale, injection et ponction	Imprégner la région cutanée concernée de désinfectant et laisser agir **Injections : 15 secondes. Ponctions : 60 secondes**	Solution prête à l'emploi Pas de dilution aqueuse
	Désinfection des muqueuses, des plaies et de la peau, brûlures	**octenisept®**	Avant toute investigation, diagnostique et intervention chirurgicale Pour le traitement des plaies	Appliquer à l'aide de compresses, humecter toute la surface à désinfecter et **laisser agir pendant 1 minute**	Solution prête à l'emploi solution aqueuse
	Antiseptique des muqueuses buccales	**octenimed®** Solution pour la gorge	Avant et après interventions sur la muqueuse de la cavité buccale	Rincer pendant env. 30 secondes avec approx. 15 ml de rinçage buccal. Selon les besoins, appliquer 2 à 3 fois par jour. Ne pas avaler. Rincer immédiatement. On peut manger et boire	Rinçage buccal tout prêt à l'emploi Pas de dilution aqueuse
	Instruments	**gigasept® Instru AF**	Après chaque usage	Après avoir immergé les instruments pendant **30 minutes**, nettoyer mécaniquement, rincer puis stériliser le cas échéant. **La concentration / le temps d'action conformément aux normes EN/prEN sont :** **3,0% - 15 minutes 2,0% - 30 minutes 1,5% - 60 minutes** Utilisation des ultrasons : 3,0% / 5 minutes. (Durée de vie de la solution 1 jour)	Solution de désinfection à 2,0% 20 ml de gigasept® Instru AF 980 ml d'eau = 1000 ml de solution de désinfection Durée de vie de la solution : 7 jours
	Désinfection rapide d'appareils médicaux, machines, surfaces et mobilier	**mikrozid® AF liquide, AF wipes, AF wipes premium, AF jumbo**	Après chaque usage	Imprégner les surfaces avec mikrozid® AF, laisser agir et le cas échéant essuyer avec une lingette **Temps d'action : 1 minute**	Solution et lingettes prêts à l'emploi (Ne pas traiter le verre acrylique et le bois naturel avec mikrozid® AF)
	Désinfection rapide sans alcool d'appareils, de surfaces et de mobilier médical	**mikrozid® sensitive liquid, sensitive wipes, sensitive wipes premium**	Après chaque emploi pour les surfaces sensibles à l'alcool	Imprégner les surfaces avec mikrozid® sensitive et laisser agir **Temps d'action : 1 minute**	Solution prête à l'emploi sans alcool et lingettes prêtes à l'emploi
	Sols, sanitaires, inventaire, appareils et mobilier	**terralin® protect**	Quotidiennement ou après contamination et salissure	Nettoyage humide des surfaces / port de gants **Temps d'action : 1 heure**	Solution de désinfection à 0,5% 5 ml de concentré 995 ml d'eau = 1000 ml de solution de désinfection

Schülke & Mayr AG | Sihlfeldstrasse 58 | 8003 Zurich | Suisse | Tél. +41 44 466 55 44 | Fax +41 44 466 55 33 | mail.ch@schuelke.com | www.schuelke.com 08.14